アップニークミニ点眼液 0.1%による眼瞼下垂の治療について

後天性眼瞼下垂は、加齢･神経疾患などの原因によって、上まぶたの筋肉を上げる作用が低下することにより引き起こされます。

アップニークミニ点眼液 0.1%（有効成分：オキシメタゾリン塩酸塩）は、まぶたを持ち上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させる作用があります。効果は、通常翌日には消失します。

1 日 1 回 1 滴ずつ、点眼をします。（1 回つかいきりの容器に入っています）点眼後 15–30 分て効果発現し、約 8 時間持続します。必要な日のみ使用も可能です。

副作用として、点眼後にまぶたのかゆみを感じることがあります。また、点眼後、瞳孔が散大する可能性があり目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。心血管系への影響が出ることがあります。

以下の項目にあてはまる方はこの点眼による治療ができない可能性があります。

- 過去に，薬や食べ物でアレルギー症状が出たことがある。
- 心血管系疾患，甲状腺疾患がある。
- 妊娠，授乳中である。
- 閉塞隅角緑内障，狭隅角である。

治療スケジュール・費用

必要検査を行い、適応を確認後、点眼処方をします。

治療継続には定期的に有効性、安全性のモニタリングのため、受診が必要です。

検査・薬剤費用は原則、自由診療（公的医療保険の対象外）となります。

点眼薬は取り寄せのため、受診前に電話で事前連絡をお願いします。

スケジュール	
初回	検査項目： 眼瞼下垂の確認検査 (必要に応じて眼科一般検査も追加) ※1 費用　： 診察・検査 (500 円または 3,000 円※1)＋点眼薬 (4,890 円/ 1 箱) ※2
2 回目以降	検査項目： 眼瞼下垂の確認検査 費用　： 診察・検査 (500 円) ＋点眼薬 (4,890 円/ 1 箱〜14,670 円/ 3 箱まで) ※2

※1　当院で 3 ヶ月以内に眼科一般検査（視力、眼圧等）を受けられた方は眼瞼下垂の確認検査のみで 500 円、受けられていない方は眼科一般検査も必要なため 3,000 円 です。

※2　1 箱 30 本入り、価格は税込です。